



## إستئصال جزء مخروطي من عنق الرحم (Cone Biopsy)

### يوم إجراء عمليتك

إنه يوم لإجراء عملية جراحية، وهذا يعني أنه سوف يتم قبولك في المستشفى ويُسمح لك بالعودة الى البيت في ذات اليوم. إنه مهم جدا أن يكون لديك من يأخذك من المستشفى لإعادتك الى بيتك.

في اليوم الذي يتم قبولك في المستشفى، ستكون لك فرصة سانحة لكي تتحدثي مع الطبيب الاختصاصي بشأن العملية. وقد يكون، أيضا، من المفيد جدا أن تقومي بتحضير لائحة بالأسئلة التي تحيين طرحها على الطبيب.

سوف يتم إعطائك مُخدرا عاما يجعلك تنامين. بعد أن يتم إنتهاء مفعول المخدر قد تشعرين ببعض الألم يكون مشابها لآلام فترة العادة الشهرية أو بتقلصات / مغص.


إذا شعرت أنك غير مرتاحة، أو كان بالك مشغولا لأي سبب آخر، إسألِي الممرضات – فهنّ موجودات هناك لمساعدتك.

### بعد إجراء عملية أخذ العينة الحية المخروطية الشكل

بعد إجراء عملية أخذ العينة الحية المخروطية الشكل، يكون من الأفضل أن تأخذي عدة أيام من الراحة بعيدا عن العمل، وأن تتلقي المساعدة من أفراد العائلة أو الصديقات بحيث تتمكنين من أن تخلدي للراحة. وفي الأسابيع التالية ستحتاجين الى أن تتحاشي القيام بنشاطات جسدية كثيرة ومرهقة، وخاصة رفع الأشياء الثقيلة.

تستطيعين أن تتوقعي بعض النزيف الدموي وإفرازات ذات لون زهري. إذا أصبحت هذه أكثر شدة من تلك التي ترافق العادة الشهرية، يتوجب عليك الإتصال بطبيبك المحلي أو بقسم الحالات العاجلة في المستشفى. يتوجب عليك الإمتناع عن القيام بأية علاقات جنسية في الأسابيع الأربعة التي تلي العملية. وسوف نتصل نحن بك هاتفيا لإعطائك النتائج التي توقرت لنا نتيجة العملية وذلك خلال مدة أسبوع تقريبا بعد العملية.

إن أخذ عينة حية للفحص بشكل مخروطي هي عملية جراحية صغيرة يتم خلالها أخذ عينة لها شكل مخروطي من النسيج البشرية الحية التي تنتزع من عنق الرحم لإجراء الفحوصات المخبرية عليها.



### يُمكن أن يُنصح بإجراء عملية أخذ العينة الحية المخروطية الشكل عندما:

- يكون قد أُجري عليك فحص عنق الرحم الـ Colposcopy وظهرت النتائج عادية، غير أن نتائج فحوصات مسحة عنق الرحم الـ Pap smear أظهرت تكرارا وجود خلايا غير طبيعية. إن فحص عنق الرحم الـ Colposcopy (راجعى ورقة المعلومات الخاصة بها)، هو فحص طبي يسمح للطبيب في أن ينظر بتمعن في عنق الرحم بواسطة أداة طبية إسمها Colposcope. هذه الأداة تسمح بإلقاء نظرة مكبرة على عنق الرحم. في بعض الأحيان، وبما أن الخلايا تكون عميقا داخل عنق الرحم، فلا يستطيع الطبيب رؤيتها.
- تكون فحوصات مسحة عنق الرحم والعينة المأخوذة من عنق الرحم قد أظهرت خلايا غدية غير طبيعية، وهي الخلايا الموجودة عميقا داخل عنق الرحم.
- يكون الطبيب الاختصاصي قلقا لجهة احتمال أن الخلايا غير الطبيعية قد شكلت خلايا أولية للسرطان.

وإلى جانب أن أخذ عينة حية بشكل مخروطي تساعد على القيام بتشخيص دقيق، فإنها غالبا ما تكون، من جهة ثانية، معالجة ناعمة وفعالة. الأنسجة البشرية المأخوذة أثناء عملية أخذ العينة الحية سوف يتم فحصها بكل دقة لتأكيد التشخيص وللنظر في ما إذا كانت الخلايا غير الطبيعية قد تمت إزالتها.



## إستئصال جزء مخروطي من عنق الرحم (Cone Biopsy)

### الحبل/ الحمل بعد عملية أخذ العينة الحية المخروطية الشكل

إن عملية أخذ العينة الحية المخروطية الشكل قد تُضعف عنق الرحم لديك، الأمر الذي قد يتسبب بالمصاعب والإشكالات أثناء فترة الحمل / الحبل. إذا حصل أن صُرت حاملاً بعد عملية أخذ العينة الحية المخروطية الشكل، دعي طبيبك أو القابلة القانونية يعلم/ تعلم بذلك. وستحتاجين إلى القيام بكشوفات خاصة أثناء فترة حملك.

### للمزيد من المعلومات

#### Dysplasia Clinic Nurse

Royal Women's Hospital  
Level 1 South, Women's Health Clinics  
Cnr Grattan St and Flemington Rd  
هاتف: (03) 8345 3548

#### قسم العناية في الحالات المستعجلة

Royal Women's Hospital  
Flemington Road entrance  
Parkville  
هاتف: (03) 8345 3636

#### رفع المسؤولية

إن Royal Women's Hospital لا يقبل بأية مسؤولية ولأي شخص كان، عن المعلومات والنصيحة (أو عن إستعمال هذه المعلومات والنصيحة) المقدمة في ورقة المعلومات هذه، أو تلك المشار إليها في المرجع. فنحن نقدم هذه المعلومات ضمن مفهوم عام، بأن الأشخاص الذين يحصلون عليها، سوف يأخذون على مسؤوليتهم أمر تقدير مدى إرتباطها وإنطباقها ودقتها بالنسبة لوضعيتهم الخاصة. تُشجع النساء على أن يقمن بمناقشة حاجات أو ضاعهن الصحية مع طبيب صحي ممارس. فإذا كانت لديك أية أمور تشغل بالك حول صحتك، فإنه يتوجب عليك أن تطلبي نصيحة من الطبيب الذي يقدم لك العناية الصحية أو، في حال كنت بحاجة إلى عناية عاجلة، فإنه يتوجب عليك أن تذهبي إلى أقرب قسم للعناية المستعجلة.

نشرت في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2008