




錐形活組織檢查

錐形活組織檢查是一種從宮頸切除一塊錐形組織進行檢查的小手術。



以下情況建議行錐形活組織檢查：

- 您已經做過陰道鏡檢查，結果看起來正常，但巴氏塗片反復提示有異常細胞。陰道鏡檢查（參見情況說明書）是醫生使用一種叫作陰道鏡的工具，近距離觀察宮頸的檢查。陰道鏡提供了放大的宮頸圖像。不過有時候如果細胞位於宮頸深處，醫生就無法看到。
- 巴氏塗片或活組織檢查提示宮頸深處有異常腺細胞。
- 專家擔心異常細胞可能已形成極早期癌。

錐形活組織檢查既有助於確診，也常常是一種有效的治療方法。錐形活組織檢查術中切除的組織將作仔細檢查，以明確診斷並檢測異常細胞是否已切除。

手術日期

這是一種當日手術，您將在當天住院出院。重要的是要有人將您從醫院接回家。

住院當日，您將有機會與專家談論該手術。將您想要詢問的所有問題事先列出來，可能會對您有所幫助。

您將接受全身麻醉，這會讓您入睡。麻醉劑失效後，您可能會感到些許疼痛，感覺好像是痛經或絞痛。

如果您感覺不舒服或感到擔心，請告訴護士——他們隨時為您提供幫助。

錐形活組織檢查術後

錐形活組織檢查術後最好休息兩天，讓家人或朋友幫助您，這樣您可以休息。接下來一周，請避免太多體力活動，特別是提舉重物。

您可能會有少許出血和粉紅色分泌物。如果出血比經血還多，您應該聯絡當地醫生或醫院急診部。4周內避免性交。我們將在1周左右電話告知您的活組織檢查結果。

錐形活組織檢查



the women's
the royal women's hospital
victoria australia

錐形活組織檢查術後懷孕

錐形活組織檢查可削弱您的宮頸，可能會引起妊娠期問題。如果您在錐形活組織檢查術後懷孕，請讓醫生或助產士知道。您妊娠期間需要接受特殊檢查。

For more information

Dysplasia Clinic Nurse

Royal Women's Hospital
Level 1 South, Women's Health Clinics
Cnr Grattan St and Flemington Rd
電話：(03) 8345 3548

急救護理科

Royal Women's Hospital
Flemington Road entrance
Parkville
電話：(03) 8345 3636

免责声明

對於本資料說明書中所述或所參考的資料或建議(或使用所述的資料或建議)，Royal Women's Hospital不向任何人承擔責任。本院提供這些資料的前提是，凡使用這些資料的人，需負責對資料的相關性和準確性加以評估。本院鼓勵婦女與醫務人員討論自身的健康需求。若對自己的健康感到關注，請向保健人員諮詢；若需緊急護理，請就近前往急診部。

2008年10月出版