



硬膜外／脊髓麻醉後回家注意事項

局部麻醉後併發症雖然極其罕見，但是仍有可能發生。如果早期發現，嚴重問題一般都能避免。如果您有以下症狀，請及早與醫院聯絡。

下面列有電話號碼。

頭痛

如果您的頭痛屬於下列情況，請與醫院聯絡：

- 限制了您的自理能力
- 在您休息、喝水或服用溫和止痛藥(如撲熱息痛)後症狀不緩解
- 坐著或站著症狀加重，而躺下感覺較好
- 伴有脖子僵硬或聽覺改變(如耳鳴或阻塞感)或眼睛問題等其他症狀。

背痛

如果您背部接受硬膜外或脊髓麻醉的注射部位感到疼痛，請與醫院聯絡，特別是如果疼痛：

- 新出現或逐漸加重——(例如疼痛沿脊柱上行或向下傳至臀部和腿部)
- 由炎症所致——(局部感到發熱或變紅，有時有分泌或滲出)
- 伴有發燒或寒顫。

下半身感覺改變

如果您感覺臀部或腿部有以下任何改變，請聯絡醫院：

- 乏力
- 麻木
- 發麻。

在您住院期間可能會發現問題，但六周以後極少出現症狀。

聯絡電話

Women's(皇家婦女醫院)急性疼痛服務中心

周一到周五：上午8:00-下午4:00

電話：8345 2389

如果電話無人接，請在我們的錄音電話上留言。如果4小時內沒給您回電，請撥打以下的下班後電話。

下班後電話 8345 2000，找值班麻醉註冊主任