



Laparoskopija u bolnici THE ROYAL WOMEN'S HOSPITAL

Što je to "laparoskopija"?

Laparoskopija je drugi naziv za operativnu proceduru koja se obavlja kroz rupicu na koži.

Laparoskopija je operacija koja se u svrhe pregleda unutarnjih organa, obavlja pod totalnom anestezijom, a koja ginekologu osigurava dobru inspekciju organa koji leže unutar zdjeljčne šupljine – maternice, jajnika i jajovoda.

Iz kojih se razloga laparoskopija provodi?

Ova se procedura može provoditi da bi se ustanovio uzrok ili objasnili simptomi određenog zdravstvenog problema koji se ne može dijagnosticirati uobičajenim putem, tj. postavljanjem pitanja i pregledom.

Može je se preporučiti kod...

- bolova u zdjelici
- neplodnosti
- sumnje na ciste na jajnicima
- sumnje na vanmaterničnu trudnoću
- endometrioze

Laparoskopija se može provoditi i kao operativna procedura, kod:

- podvezivanja jajnika
- histerektomije
- liječenja nekontroliranog mokrenja ili prolapsa organa.

Pred-operativna priprema

Priprema za ovu vrstu operacije, obično uključuje post i suzdržavanje od pušenja. Prije određenih operativnih procedura, pacijentima se daju sredstva za pražnjenje crijeva. Obavijestit će vas se ako će to biti potrebno i u vašem slučaju.

Operacija

Laparoskopija se provodi pod totalnim anestetikom. Najprije se napravi rez na koži, odmah ispod pupka. Kroz ovaj se rez zatim uvodi igla, putem koje se trbuh napuhuje ugljičnim dioksidom. Ovaj postupak ginekologu osigurava bolji pregled organa koji se nalaze unutar zdjeljčne šupljine. Zatim se uvodi posebna vrsta teleskopa (tzv. laparoskop), na kojeg je priključena video-kamera. U zdjeljčnu šupljinu se, kroz male rezove koji se otvaraju odmah iznad pubičnih dlačica, mogu uvesti i drugi instrumenti. Oni se na kraju operacije vade, unešeni plin se ispušta, a koža se zatvara ljepljivom trakom, kirurškim šavovima ili kopčama.

A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



Moguće komplikacije

Rizik je kod svake operacije moguć, ali je on u slučaju laparoskopije vrlo mali. Nešto je veći za pušačice, žene kojima je tjelesna težina značajno veća od optimalne ili za one koje imaju drugih zdravstvenih problema.

Neke od komplikacija uključuju:

- krvarenje
- oštećenje crijeva, mokraćnog mjehura, krvnih žila ili drugih organa
- infekcije maternice ili područja u blizini operativnih rana.

Nakon operacije

Nakon operacije, možda ćete osjećati:

- određeni stupanj mučnine
- nelagodu ili umor, koji se mogu očekivati idućih 5 dana
- bol u području operativne rane
- bol u mišićju
- bol u vrhovima ramena i u području rebra. Ova bol je posljedica zaostajanja male količine plina ispod ošita.
- Također se mogu javiti bolovi nalik menstruacionima, uz istovremenu pojavu vaginalnog iscjetka kroz nekoliko dana.

Ukoliko je potrebno, možete uzimati tablete protiv bolova.

Kada simptomi nestanu i kada se budete osjećali bolje, možete nastaviti sa svojim uobičajenim tjelesnim i seksualnim aktivnostima. Ukoliko simptomi ne nestanu, obratite se svome mjesnom liječniku.

O rezultatima laparoskopije ćete biti obaviješteni prije vašeg otpuštanja iz bolnice, a ukoliko vam je potrebno dodatno liječenje, za njega će vam se osigurati termin. Odmah kada vam to bude odgovaralo, za vas će se ugovoriti posjet ambulantnoj ginekološkoj klinici.

Ako budete imali šavove ili kopče, uklonit će vam ih se u vašem mjesnom zdravstvenom centru, tri dana nakon operacije.

Ukoliko vam je nakon otpuštanja iz bolnice hitno potrebna medicinska pomoć, odmah se obratite svom mjesnom liječniku ili nazovite odjel za hitnu intervenciju, bolnice Royal Women's Hospital, na **9344 2301**.