


## **LEEP** ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

### **Τι είναι το LEEP;**

Τα αρχικά LEEP σημαίνουν “Loop Electrosurgical Excision Procedure” (Διαδικασία Θηλειακής Ηλεκτροχειρουργικής Αφαίρεσης). Είναι μια μικρή επέμβαση με την οποία αφαιρείται ένα μικρό κομμάτι ανώμαλου ιστού (βιοψία) από τον τράχηλο για ανάλυση.

Η διαδικασία εκτελείται κάτω από ελαφρά Γενική Αναισθησία ή Τοπική Αναισθησία στη Μονάδα Ημερήσιων Επεμβάσεων, που βρίσκεται στον 7ο Οροφο του νοσοκομείου. Αν γίνει κάτω από τοπική αναισθησία, η ένεση του αναισθητικού γίνεται στον τράχηλο. Αυτό θα ναρκώσει την περιοχή και θα βοηθήσει στον έλεγχο της αιμορραγίας. Ένα όργανο που μοιάζει με θηλειά θα χρησιμοποιηθεί για να αφαιρεθεί ένα κομμάτι του ανώμαλου ιστού από τον τράχηλο.



## A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



### Διάγραμμα της ανατομίας

Προεγχειρητική διαδικασία

Πληροφορίες για την εγχείρηση, όπως ώρα εισαγωγής, θα σας σταλούν από το γραφείο εισαγωγών όταν έχουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για εσάς.

Αν πρέπει να κάνετε γενική αναισθησία θα χρειαστεί να έρθετε στην κλινική για εξέταση πριν την εγχείρησή σας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε όλα τα απαιτούμενα χαρτιά και για εσάς να υπογράψετε το έντυπο 'Συγκατάθεσης Εγχείρησης'. Θα πρέπει επίσης να μη φάτε και να μη πιείτε τίποτα για έξι ώρες πριν την εισαγωγή σας την ημέρα της εγχείρησης. Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο θα είναι περίπου 5 ώρες και θα πρέπει να κανονίσετε για κάποιον να σας μεταφέρει σπίτι σας μετά το αναισθητικό.

### Τι γίνεται μετά;

Η βιοψία του ιστού θα σταλεί στο μικροβιολογικό εργαστήριο όπου θα εξεταστεί με μικροσκόπιο. Θα σας ειδοποιήσουμε για τα αποτελέσματα.

Αν σας έκαναν γενική αναισθησία, θα σας ζητήσουν να αναπαυθείτε στην αίθουσα ανάρρωσης για 1 με 2 ώρες. Θα σας προσφέρουν μερικά ελαφρά εδέσματα. Αν σας έκαναν τοπική αναισθησία, δεν θα χρειαστεί να περιμένετε. Μετά τη διαδικασία αυτή σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιήσετε ταμπόν και να μην έχετε σεξουαλική επαφή για 3 με 4 εβδομάδες για να επουλώσει ο τράχηλος. Μπορεί να έχετε κάποια διαρροή υγρών ή ελαφρά αιμορραγία για μέχρι και τέσσερις εβδομάδες μετά τη διαδικασία.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη Νοσοκόμα Δυσπλασίας στο (03) 9344 2987. Αν η Νοσοκόμα είναι απασχολημένη, αφήστε μήνυμα με το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.