



Λαπαροσκόπηση ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τι είναι η Λαπαροσκόπηση;

Λαπαροσκόπηση είναι ένας άλλος όρος για την εγχείρηση μέσω μιας μικρής τομής.

Η λαπαροσκόπηση είναι μια ερευνητική επέμβαση που γίνεται κάτω από γενική νάρκωση και επιτρέπει στον γυναικολόγο να εξετάσει τα όργανα της λεκάνης σας - τη μήτρα, τις ωθήκες και τις σάλπιγγες.

Γιατί χρειάζεται η Λαπαροσκόπηση;

Η λαπαροσκόπηση μπορεί να γίνει για να εντοπιστεί μια αιτία ή ένα σύμπτωμα που είναι αδύνατο να διαγνωστεί με την κανονική διαδικασία ερωτήσεων και εξετάσεων.

Μπορεί να συσταθεί για...

- Πυελικό πόνο
- Στείρωση
- Υποψία κυστών στις ωθήκες
- Υποψία για εξωμήτρια κύηση
- Ενδομητρίωση

Η λαπαροσκόπηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση επεμβάσεων όπως:

- Σάλπιγγική στείρωση
- Υστερεκτομή
- Θεραπεία ακράτειας ή πρόπτωσης

Προεγχειρητική προετοιμασία

Η συνήθης προεγχειρητική προετοιμασία γι' αυτή τη εγχείρηση περιλαμβάνει νηστεία και σταμάτημα του καπνίσματος. Για μερικές εγχειρήσεις μπορεί να χρειαστεί να πάρετε φάρμακα για να σας βοηθήσουν να καθαρίσετε το έντερο. Θα σας ενημερώσουν αν αυτό είναι αναγκαίο.

Η επέμβαση

Η λαπαροσκόπηση γίνεται κάτω από γενική νάρκωση. Αυτή η επέμβαση γίνεται με μια τομή κάτω από τον ομφαλό. Θα εισαχθεί μια βελόνα μέσω αυτής της τομής και θα φουσκώσουν την κοιλιά σας με αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό διευκολύνει τον γυναικολόγο να δει τα όργανα της λεκάνης σας. Μετά εισάγεται ένα τηλεσκόπιο (λαπαροσκόπιο) με συνδεδεμένο βίντεο. Μπορεί να εισαχθούν και άλλα όργανα μέσω λεπτών τομών που γίνονται ακριβώς πάνω απ' το τριχωτό του εφθβαιου. Στο τέλος της επέμβασης αφαιρούνται όλα τα όργανα, το αέριο ελευθερώνεται και οι τομές στο δέρμα κλείνονται με ταινία, ράμματα ή συνδετήρες.

A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



Επιπλοκές

Ολες οι εγχειρήσεις έχουν κινδύνους, αλλά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή την εγχείρηση είναι ασήμαντοι. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για γυναίκες που καπνίζουν, που είναι υπερβολικά υπέρβαρες ή έχουν άλλα προβλήματα υγείας.

Μερικές απ' τις επιπλοκές που μπορεί να συμβούν είναι:

- Αιμορραγία
- Βλάβη στο έντερο, ουροδόχο κύστη, αιμοφόρα αγγεία ή άλλα όργανα.
- Λοίμωξη της μήτρας ή των σημείων εισαγωγής.

Τι γίνεται μετά;

Μετά την εγχείρηση μπορεί να αισθάνεστε:

- Κάποιου βαθμού ναυτία.
- Ενόχληση και κούραση είναι συνηθισμένα για μέχρι και 5 ημέρες.
- Πόνος στα σημεία που έγιναν οι τομές.
- Μυαλγία (πόνος στους μύς).
- Πόνος στην άκρη του ώμου και θώρακα. Αυτό συμβαίνει επειδή μια μικρή ποσότητα αερίου παραμένει κάτω απ' το διάφραγμα.
- Μπορεί επίσης να υπάρχουν πόνοι που μοιάζουν με πόνους περιόδου και για λίγες μέρες κολπική αιμορραγία ή εκροή.

Αν χρειάζεται μπορείτε να πάρετε παυσίπονα.

Μόλις τα συμπτώματα καθυσηχάσουν και αισθάνεστε καλύτερα μπορείτε να αρχίσετε τις κανονικές σας σωματικές και σεξουαλικές δραστηριότητες. Αν τα συμπτώματα δεν καθυσηχάσουν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό.

Τα αποτελέσματα της λαπαροσκόπησης θα συζητηθούν μαζί σας πριν φύγετε απ' το Νοσοκομείο και αν είναι αναγκαίο θα κανονιστεί για αργότερα περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Θα σας κλείσουν ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία του Γυναικολογικού Τμήματος όταν σας βολεύει εσάς.

Αν έχετε ράμματα ή συνδετήρες θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον οικογενειακό σας γιατρό την τρίτη ημέρα μετά την εγχείρηση.

Αν χρειάζεστε επείγουσα προσοχή μετά το εξιτήριό σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οικογενειακό σας γιατρό ή με το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών στο Βασιλικό Νοσοκομείο Γυναικών στον αριθμό **9344 2301**.