



## The Royal Women's Hospital Information for Women

### 6. វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ – Intra Uterine Device (IUD) (ឧបករណ៍ដាក់ក្នុងស្បូន)

ខែមេសា ឆ្នាំ 2004

#### 6. CONTRACEPTION – INTRA UTERINE DEVICE (IUD)

##### ហេតុអ្វីបានជាប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ?

ការបង្ការមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះ គឺជាការចាំបាច់ បើអ្នកចង់ចៀសវាងផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បាន និង ជំងឺកាមរោគ។ រៀងរាល់ខែ អ្នកផ្សេងៗស្រ្តីផ្សេងៗមេជីវិតស្រ្តី។ នៅពេលដែលបុរសបញ្ចេញទឹកកាម ទឹកកាមនេះមានមេជីវិតបុរសរាប់លាន។ វាត្រូវការតែមេជីវិតបុរសនេះមួយប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីចូលទៅបង្កាត់ក្នុងពងមេជីវិតស្រ្តី ហើយចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ។ បើគ្រូស្រករធ្វើការរួមរកនឹងគ្នា (លើក្នុងក្នុងរន្ធលោស) ហើយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទេនោះ ស្រ្តីមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។ ការប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករួមរក ហើយចៀសវាងការមានផ្ទៃពោះដោយអចេតនា។

##### ស្រោមអនាម័យ មិនមែនជាកំនិតល្អជានិច្ចឡើយ

ប្រទេសអូស្ត្រាលី មានជំងឺកាមរោគថ្មីជាង 20 000 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ជំងឺកាមរោគទូទៅបំផុតគឺ chlamydia ដែលអាចធ្វើឲ្យមិនអាចមានកូនបាន បើទុកចោលមិនព្យាបាលទេនោះ។ ស្រោមអនាម័យគឺជាការការពារប្រសើរបំផុតរបស់អ្នកទល់នឹងជំងឺកាមរោគ។ បើអ្នកប្រើស្រោមអនាម័យនិងប្រុងប្រយ័ត្នជាតិទឹក នៅរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ អ្នកនឹងមានឱកាសតិចក្នុងការឆ្លង HIV/AIDS និងជំងឺកាមរោគ (STIs)។

#### Intra Uterine Device (IUD) (ឧបករណ៍ដាក់ក្នុងស្បូន)

##### តើ IUD គឺជាអ្វីទៅ?

IUD គឺជាឧបករណ៍តូចមួយសំរាប់បង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ដែលត្រូវដាក់ទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្រ្តី។ IUD មានពីរប្រភេទ :

- **IUD ទង់ដែង** គឺជាឧបករណ៍តូចមួយ ដែលមានទង់ដែងនៅជុំវិញគល់របស់វា។
- **Progestogen (Mirena) IUD** គឺជាឧបករណ៍តូចមួយមានរូបរាងដូចអក្សរ T ដោយមានបំពង់មួយដែលមានអ័រម៉ូន progestogen នៅជុំវិញគល់របស់វា។

### របៀបបំពេញមុខងាររបស់ IUD

ទោះជាគេបានប្រើ IUD អស់ពេលជាង 30 ឆ្នាំមកហើយដើម្បីបង្ការការមានផ្ទៃពោះក្តី ក៏គេនៅមិនទាន់យល់នូវរបៀបបំពេញមុខងាររបស់វាឡើយទេ។ IUD មានផលប៉ះពាល់ទៅលើចលនានិងភាពរស់រានមានជីវិតរបស់មេជីវិតបុរស នៅក្នុងស្បូនដូច្នោះវាមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ពងមេជីវិតស្រ្តី ដើម្បីបង្កាត់ពងនេះបានទេ។ IUD ក៏ផ្តាស់ប្តូរដល់ស្រទាប់ក្នុងរបស់ស្បូន (endometrium) ផងដែរ ដើម្បីកុំឲ្យវាសក្តិសមនឹងមានផ្ទៃពោះ ហើយបង្ការកុំឲ្យពងមេជីវិតស្រ្តីបង្កទៅជាផ្ទៃពោះបាន បើវាពិតជាទទួលបានការបង្កាត់ដោយមេជីវិតបុរសមែននោះ។

### តើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដែរ?

IUD មានប្រសិទ្ធភាពរវាង 95 និង 99 ភាគរយ ដែលប្រហែលគ្នានឹង The Pill “ថ្នាំគ្រាប់” (អាសប័ណ្ណព័ត៌មាន វិទីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះទី 3 The Pill [ថ្នាំគ្រាប់])។

### គុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិនៃ IUD

#### គុណសម្បត្តិ

ទាំង IUD ទង់ដៃ និង ទាំង Mirena IUD មានផលប្រយោជន៍ដូចតទៅនេះ :

- បង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះរយៈពេលយូរដែលមានប្រសិទ្ធភាព (យ៉ាងតិចប្រាំឆ្នាំ)
- ងាយស្រួលនឹងថែទាំ អ្នកមិនអាចភ្លេចប្រើវាដូចដែលអ្នកប្រហែលជាភ្លេចនៅពេលលេប The Pill (ថ្នាំគ្រាប់)នោះឡើយ
- វាមានតម្លៃថោកជាងវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះផ្សេងទៀត (ថ្លៃជាងនៅគ្រាដំបូង ប៉ុន្តែថោកជាងនៅរយៈពេលយូរ)
- បើអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះ អ្នកអាចព្យាយាមមានផ្ទៃពោះនៅពេលមួយរំពេចបន្ទាប់ពីអ្នកដកវាចេញ។

**Progestogen (Mirena) IUD** បានបន្ថែមផលប្រយោជន៍នៃការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ឈាមនៅពេលមានផ្ទៃពោះ និងជាផលប្រយោជន៍ចំពោះស្ត្រីដែលជាធម្មតានឹងមានផ្ទៃពោះយូរពេលនិងធ្លាក់ឈាមច្រើន ឬស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះតែមួយពេលនិងធ្លាក់ឈាមរឹតតែច្រើន នៅពេលប្រើ IUD ទង់ដៃ។

#### គុណវិបត្តិ

ទាំង IUD ទង់ដៃ និង ទាំង Mirena IUD មានគុណវិបត្តិដូចតទៅនេះ :

- ទោះជាកំរិត នៅពេលដែល IUD គ្មានប្រសិទ្ធភាព ហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឧបករណ៍នេះត្រូវតែដកយកចេញយ៉ាងរហ័សតាមលទ្ធភាព។ IUD នៅក្នុងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ បង្កើនលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការរលូតកូន
- IUD អាចខូចចេញពីស្បូនដោយខ្លួនវា ជាធម្មតាគឺក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីអាចមិនដឹងថា ហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងទេ ហើយគួរឆែកមើលជានិច្ចថា តើខ្សែរបស់វា នៅនឹងកន្លែងដែរឬទេ
- មានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺប្រេ ក្នុងពេលបិទអាទិត្យ ក្រោយសឹកវាហើយ
- ដោយសារតែជំងឺប្រេនៅមុំសាច់ដុំឆ្អឹងត្រជាក់ អាចបណ្តាលឲ្យមិនអាចមានផ្ទៃពោះបាន វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលស្ត្រីដែលដាក់ IUD ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសអំពីការការពារខ្លួននឹងជំងឺកាមរោគ
- IUD អាចទម្លាយជញ្ជាំងស្បូន។ ហេតុការណ៍នេះកំរើតមានណាស់ ហើយអាចកើតមាននៅពេលកំពុងសឹក IUD
- មានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការមានកូនក្រៅស្បូនផងដែរ (ពេលដែលពងមេជីវិតស្រ្តីដែលបង្កាត់ហើយ ស្ថិតនៅក្នុងដៃស្បូន) នៅពេលដែល IUD គ្មានប្រសិទ្ធភាព (ហេតុការណ៍នេះកំរើតមានណាស់ជាមួយនឹង IUD ទង់ដៃ ហើយថែទាំអំពីតែកំរើតមានជាមួយនឹង Progestogen IUD ទៀតផង)។

**Progestogen IUD** ក៏អាចមានផលវិបាកដូចគ្នាទៅនេះផងដែរ :

- ការធ្លាក់ឈាមប្រចាំខែធ្ងន់ឡើងទ្វេដង ទំនងជាកើតមាននៅក្នុងពេលបីទៅប្រាំខែដំបូង។ យ៉ាងណាមិញ ជាយថាហេតុនោះ បើមានរូរិញនោះ ក៏អ្នកទំនងជាមានរដូវប្រចាំខែធម្មតាតូចដែរ នៅពេលប្រើ Progestogen IUD
- អាចបណ្តាលឲ្យទំនងជាមានកំណើនតិចតួច នៅក្នុងភាពស្ងួតនៃរន្ធយោនី ក្តៅក្រហាយ ឈឺក្បាល ចង្កុរ និង កើតមុន។

**IUD ទង់ដែង** អាចបណ្តាលឲ្យរដូវរបស់អ្នករឹតតែច្រើនឡើង និងឈឺចាប់ខ្លាំងឡើង

**អ្នកណាទៅដែលអាចប្រើ IUD?**

- គ្រូដែលមានកូន
- គ្រូមានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់តិចក្នុងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ
- គ្រូដែលមិនអាច ឬ មិនចង់លេប The Pill (ថ្នាំគ្រាប់)។

**អ្នកណាទៅដែលមិនគួរប្រើ IUD?**

- គ្រូដែលមានលទ្ធភាពគ្រោះថ្នាក់យូរពេលក្នុងការឆ្លងជំងឺកាមរោគ (STIs) មិនគួរដាក់ IUD ទេ
- គ្រូដែលមានការធ្លាក់ឈាមតាមរន្ធយោនីដែលគ្មានរោគវិនិច្ឆ័យ
- គ្រូដែលមានរោគរលាកម៉ូសាច់ជុំវិញត្រគាក។

**ការដាក់ IUD**

**ការរៀបចំ**

មុនពេលអ្នកដាក់ IUD អ្នកគួរ :

- ធ្វើតេស្ត Pap smear (ដោះមាត់ស្បូន) និង swabs (ដុតស្បូន) ដើម្បីឲ្យដឹងប្រាកដថា ពុំមានជំងឺហ្វេម៉ាលីនីយ៉ាម ឬ ជំងឺផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងត្រគាកឡើយ
- ធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្នកគ្មានផ្ទៃពោះឡើយ (ដូច្នោះ ត្រូវដាក់ IUD ភ្លាម នៅក្រោយពីអ្នកមានរដូវ ឬ ប្រើវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះដែលអាចទុកចិត្តបាន រហូតដល់ពេលអាចដាក់វា)។

**តើដាក់ IUD តាមរបៀបណា**

អ្នកនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងគ្លីនិក នៅក្នុងទីតាំងប្រៀបដូចគ្នានឹងពេលដែលអ្នកនឹងហៀបធ្វើតេស្ត Pap smear យ៉ាងដូច្នោះដែរ។ ប្រដាប់សំរាប់ដាក់ក្នុងរន្ធយោនីត្រូវដាក់ទៅក្នុងរន្ធយោនីអ្នក ហើយកស្បូនអ្នកនឹងត្រូវដុតស្បូនដោយទឹកកកម្ខាតដោយទឹកកកម្ខាត។ ប្រដាប់របស់ស្បូននឹងត្រូវវាស់វែង ហើយ IUD ត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុង តាមរយៈកស្បូន ឬផ្លូវបើករបស់ស្បូន។ ខ្សែរបស់ IUD ត្រូវបានកាត់ចេញ ដើម្បីឲ្យវាស្ថិតនៅខាងក្នុងរន្ធយោនី។ អ្នក ឬ ដៃគូរួមរ័ករបស់អ្នកនឹងមិនកត់សំគាល់ខ្សែនេះទេ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែអាចស្វ័យដឹងខ្សែនេះ បើអ្នកអាចលូកចូលទៅក្នុងរន្ធយោនីរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងត្រូវរង់ចាំនៅគ្លីនិកនេះរយៈពេលប្រហែល 15 នាទី ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្នកពិតជាគ្មានអារម្មណ៍នៃភាពមិនសុខស្រួលដែលមិនចាំបាច់ ឬ ការឈឺចាប់ឡើយ។

វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកមិនត្រូវរួមរ័ក ឬ ប្រើ tampons (វត្ថុស្រកពេលមានរដូវ) រយៈពេល 48 ម៉ោង ក្រោយពីដាក់ IUD ហើយ ដើម្បីបង្ការកុំមានជំងឺ។

### តើមានអ្វីកើតឡើងទៅ បើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា មានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវបានកើតឡើងនោះ?

សូមទាក់ទងផ្ទះជួបពិគ្រោះរបស់អ្នក នៅពេល :

- មានអារម្មណ៍ថា ខ្សែមានប្រវែងខ្លី ឬ វែងជាងធម្មតា ដោយសារតែ IUD អាចប្តូរទីតាំង។ វាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការរកមើលប្រវែងខ្សែ ក្រោយពីមានរដូវម្តងៗ
- អ្នកឈឺពោះនៅផ្នែកខាងក្រោយដែលមិនបាត់ទៅវិញ ជាពិសេសនៅពេលកើតមានព្រមជាមួយនឹងគ្រុនក្តៅ
- អ្នកធ្លាក់ស ឬ ធ្លាក់ឈាមមិនធម្មតា ឬមានការឈឺចាប់នៅពេលរួមភេទ
- អ្នក ឬ គូកំណត់អ្នកធ្វើការរួមភេទមួយផ្សេងទៀត ដែលបង្កើនលទ្ធភាពធ្វើឲ្យអ្នកមានជំងឺកាមរោគ
- ប្រាំមួយអាទិត្យក្រោយពីដាក់ IUD មក ហើយបន្ទាប់មក នៅរាល់ពេល 12 ខែម្តង

### ទីកន្លែងទទួលព័ត៌មានបន្ថែម

**Women’s Health Information Centre (RWH)**  
 (03) 8345 3045  
 1800 442 007 (ទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ) អ៊ីមែល : [whic@thewomens.org.au](mailto:whic@thewomens.org.au)  
<http://www.thewomens.org.au>

**Choices Clinic នៅ Royal Women’s Hospital**  
 កិច្ចបំរើអស់ថ្ងៃតិច ដែលផ្តល់ឱ្យការពិគ្រោះយោបល់ និង ការព្យាបាលសំរាប់តម្រូវការទាំងអស់នៃវិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ និង សុខភាពផ្នែកភេទ។  
 ម៉ោងធ្វើការ : ថ្ងៃច័ន្ទ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង 8:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 11:30 ព្រឹក  
 ទូរស័ព្ទ : (03) 8345 2000

### ប័ណ្ណព័ត៌មានឯទៀតរបស់ RWH ដែលអាចមានប្រយោជន៍សំរាប់អ្នក

RWH មានប័ណ្ណព័ត៌មានផ្សេងៗជាភាសាច្រើន នៅតាមអ៊ីនធើណិត។ បើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចបើកមើលទីបំរើបណ្តាញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង។ អាសយដ្ឋានគឺ <http://www.thewomens.org.au>

អ្នកក៏អាចសុំឲ្យអ្នកថែទាំអ្នកនៅ Royal Women’s Hospital ផ្តល់ប័ណ្ណព័ត៌មានឯទៀតអំពី វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះផងដែរ។ សុំយក :

- ទី 1 វិធីបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ ជំរើសរបស់អ្នក
- ទី 2 ស្រោមអនាម័យ និង ស្រោម Diaphragms
- ទី 3 The Pill (ថ្នាំគ្រាប់)
- ទី 4 Depo Provera - ថ្នាំចាក់បង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ
- ទី 5 Implanon – ការវះដុំបង្ការកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ