


LEEP у ROYAL WOMEN'S БОЛНИЦИ

Шта је LEEP?

Назив LEEP је скраћено за "Loop Electrosurgical Excision Procedure". То је мала операција где се мали део абнормалног ткива (биопсија) отклони са грлића материце ради испитивања.

Процедура се врши под лакој општој анестезијом или локалној анестезијом у Јединици за дневну хирургију, која се налази на 7. спрату болнице. Ако се врши под локалној анестезијом, анестезија ће бити убризгана у грлић материце. Ово ће утрнути то место и помоћи да се контролише какво крварење. Инструмент који личи на жичано коло ће се користити да се отклони абнормалан део ткива са грлића материце.



A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



Преоперативна припрема

Информације о хирургији, као што је време доласка, добићете од рецепције када будемо имали датум за вас.

Ако будете морали бити под општом анестезијом, захтеваћемо да будете у нашој прелиминарној клиници пре хирургије. Ово ће нам дати прилике да попунимо потребне папире и да потпишете формулар “Пристанак на операцију”. Такође ћете морати да се уздржите од јела и пића за шест сати пре него што дођете на дан хирургије. Можете очекивати да ћете бити у болници око 5 сати и требало би да организујете да вас неко одвезе кући после анестезије.

Шта се после дешава?

Биопсија ткива се однесе у патолошку лабораторију где ће под микроскопом бити испитано. Обавестићемо вас о резултатима.

Ако сте били под општом анестезијом, замолићемо вас да се од 1 до 2 часа одморите у нашем одмаралишту. Понудићемо вам лагана освежења. Ако сте били под локалном анестезијом, нећете морати да чекате. Након ове процедуре саветоваћемо вас да не користите тампоне, нити да имате сексуалне односе за 3 до 4 недеље, како би грлић материце могао да се излечи. Након процедуре можете да доживите лучење или лагано крварење до четири недеље.

Ако би хтели даље информације, молимо вас назовите сестру за диспласију на (03) 9344 2987. Ако сестра није на располагању, молимо вас оставите поруку са вашим именом и бројем телефона.