



## **Лапароскопија** у ROYAL WOMEN'S БОЛНИЦИ

### **Шта је лапароскопија?**

Лапароскопија је други назив за хирургију кроз мали отвор на телу.

Лапароскопија је истраживачка операција која се врши под општом анестезијом, што омогућава гинекологу да прегледа ваше пелвичне органе - материцу, јајнике и јајоводе.

### **Зашто је потребна лапароскопија?**

Лапароскопија се може вршити како би се препознао узрок или симптом на који се обичним испитивањем и прегледом не може дати дијагноза.

Може се препоручити за...

- Пелвичне болове
- Неplодност
- Сумњу за израслине на јајницима
- Сумњу за ектопичну трудноћу
- Ендометриозу

Лапароскопија се такође може користити у извршавању операција као што су:

- Стерилизација јајовода
- Хистеректомија
- Третирање немогућности задржавања или пролапсе

### **Преоперативна припрема**

Обична преоперативна припрема за ову хирургију укључује пост и уздржавање од пушења. За неку врсту хирургије можда ћете морати да узмете лекове како би вам се утроба испразнила. Обавестићемо вас ако ово буде потребно.

### **Операција**

Лапароскопија се врши под општом анестезијом. Ова операција укључује разрезавање испод пупка (umbilicus- a). Кроз овај отвор ставиће се игла и средњи део вашег тела ће се надувати гасом угљендиоксида. Ово омогућава вашем гинекологу да лакше прегледа ваше пелвичне органе. Телескоп (лапароскоп) са причвршћеним видео апаратом ће се затим ставити. Други инструменти се могу ставити кроз мале разрезане отворе одмах изнад стидних длачица. На крају операције сви се инструменти ваде, гас се испушта и разрези у кожи се затворе траком, копчама или посебним штипаљкама.

# A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



## Компликације

Ниједна хирургија није без ризика, али ризици повезани са овом хирургијом су веома мали. Ризик је већи за жене које пуше, које су доста гојазне или које имају друге здравствене проблеме.

Неке компликације које се могу десити су:

- Крварење
- Оштећење утробе, бешике, крвних судова или других органа.
- Инфекција материце или места где су инструменти улазили.

## Шта се дешава после?

Након хирургије можете осетити

- Извесну слабост
- Нелагодност и умор су уобичајене до 5 дана.
- Бол где су направљени разреза.
- Бол у мишићима.
- Бол на врху рамена и у ребрима. Ово је због мале количине гаса која остаје испод дијафрагме.
- Такође може доћи до болова сличних менструалним и неколико дана вагиналног крварења или лучења.

По потреби могу се узимати таблете за ублажавање бола.

Чим се симптоми буду смирили и боље се будете осећали, можете наставити са уобичајеним физичким и сексуалним активностима. Ако се симптоми не смире, требало би да контактирате вашег локалног лекара.

О резултатима лапароскопије ће се са вама дискутовати пре него што будете отпуштени из болнице и по потреби организоваће се даљи третман за каснији датум. Чим за вас буде прикладно организоваће се састанак за вас у Гинеколошкој клиници за посећујуће пацијенте.

Ако имате копче или штипаљке, ваш локални медицински званичник треба да их отклони 3. дана након операције.

Ако вам буде потребна хитна интервенција након отпуштања требало би да контактирате вашег локалног лекара или Хитну помоћ болнице Royal Women's на **9344 2301**.