



## ROYAL WOMEN'S HOSPITAL'DA *Laparoscopy*

### **Laparoskopi Nedir?**

Laparoskopi, ufak bir delikten girilerek yapılan ameliyatın diğer bir tanımıdır. Laparoskopi kadın hastalıkları uzman doktorunun (jinekolog doktor) hasta genel anestezi altındayken alt karın organlarını - rahmi, yumurtalıkları ve fallop tüplerini görerek yaptığı bir inceleme işlemidir.

### **Laparoskopi'ye neden gerek görülür?**

Sıradan bir muayene veya sorularla teşhis konulamayan bir hastalığın sebebini veya belirtilerini tanımlamak için laproskopi uygulanabilir.

Bu işlem...

- Alt karın bölümündeki ağrılar
- Kısırlık
- Yumurtalıkta bir kist oluşmasından şüphelenme
- Ektopik hamilelikten şüphelenme
- Endometriozis

için önerilebilir.

Laparoskopi ayrıca:

- Kısırlaştırma
- Rahmin ameliyatla çıkarılması
- İdrar veya aptest tutamama veya rahmin sarkmasının tedavisi için uygulanan ameliyatlarda uygulanabilir.

### **Ameliyat Öncesi hazırlık**

Bu ameliyattan önce herhangi birşey yememe ve içmeme ve ayrıca sigara içmeme öngörülen olağan hazırlıklardır. Bazı ameliyatlar için barsaklarınızı boşaltmak üzere size ilaç verilebilir. Bu gerektiğinde size bildirilir.

# A Royal Women's Hospital Well Women's Publication



## Ameliyat

Laparoskopi genel anestezi altında yapılır. Göbek deliğinin hemen altındaki bölüm kesilir. Bu kesikten bir iğne sokulur ve karnınız karbon dioksit gazı verilerek şişirilir. Bu jinekolog doktorun alt karın organlarınızı daha iyi görmesini sağlar. Daha sonra video ileştirilmiş bir teleskop (laproskop) içeri sokulur. Pübis kıllarının başladığı yerin hemen üzerinde de küçük kesikler açılarak diğer bazı aletler sokulabilir. Ameliyatın sonunda tüm aletler çıkarılır, gaz boşaltılır ve kesilen yerler bant, dikiş veya kıskaçlarla kapanır.

## Komplikasyonlar

Risk taşımayan ameliyat yoktur, fakat bu ameliyatta risk oluşma olasılığı çok azdır. Sigara içen, oldukça kilolu veya diğer sağlık sorunları olan kadınlarda risk daha yüksektir.

- Kanama
- Barsak, idrar torbası, kan damarları veya diğer organların zedelenmesi
- Rahmin veya alet sokulan yerlerin iltihaplanması

görülebilecek komplikasyonlardır.

## Daha sonra ne olur?

Ameliyattan sonra

- mide bulantısı.
- 5 gün kadar sürebilen rahatsızlık veya yorgunluk hissetmeniz olağandır.
- Kesilen yerlerin acıması.
- Kasların ağrması.
- Diyaframın altında az miktarda kalan gaz nedeniyle omuz başlarında ve göğüs kafesinde ağrı.
- Adet zamanı ağrısı ve birkaç gün sürebilen vajinal kanama veya akıntı.

Gerekirse ağrı kesici tablet alınabilir.

Bu şekil belirtilerin kaybolduğunda kendinizi daha iyi hissettiğiniz zaman olağan fiziksel ve cinsel etkinliklerinize başlayabilirsiniz. Belirtiler kaybolmadığı takdirde yerel doktorunuza başvurmalısınız.

Yapılan laproskopinin sonuçları hastaneden taburcu edilmeden önce size bildirilecektir ve eğer ayrıca bir tedavi gerekiyorsa bunun için ilerde bir gün saptanacaktır. Sizin için uygun olan bir tarihte Kadın Hastalıkları Kliniği (jinekoloji) ayakta tedavi (outpatients) bölümüne gelmeniz için bir randevu verilecektir.

Dikiş veya kıskaçlarınız varsa ameliyattan sonraki 3. gün yerel doktorunuz tarafından alınmalıdır.

Hastaneden çıktıktan sonra acil bir durum olduğunda yerel doktorunuza veya Royal Women's Hospital'ın Acil Bölümünü **9344 2301 no'lu** telefonundan arayınız.