



Về nhà sau phẫu thuật Gây tê ngoài màng cứng/Xương sống

Các tai biến sau gây tê khu vực vẫn có thể xảy ra mặc dù đây là điều hết sức hiếm hoi. Nói chung, các vấn đề nghiêm trọng có thể tránh được nếu phát hiện được sớm. Nếu có bất cứ triệu chứng nào dưới đây, quý vị cần liên lạc bệnh viện càng sớm càng tốt.

Các số điện thoại được liệt kê dưới đây.

Nhức đầu

Liên lạc bệnh viện nếu cơn nhức đầu:

- hạn chế khả năng quý vị tự chăm sóc cho mình
- sau khi nghỉ ngơi, uống nước hay thuốc giảm đau loại nhẹ như paracetamol cơn nhức đầu vẫn không dứt
- trở nên tệ hơn khi đang ngồi hay đứng nhưng thấy đỡ hơn khi nằm xuống
- có thêm các triệu chứng khác như cổ bị cứng hay thính giác có thay đổi (thí dụ như có tiếng vang hay cảm giác bị nghẽn) hay có những trở ngại về mắt.

Đau lưng

Liên lạc bệnh viện nếu quý vị bị đau lưng ở chỗ gây tê ngoài màng cứng hay chỗ xương sống được tiêm, đặc biệt là nếu cơn đau:

- mới lạ hay trở nên tệ hơn – (thí dụ như nếu cơn đau chạy lên xương sống hay xuống mông và hai chân)
- do bị sưng – (có thể quý vị thấy nóng hay chỗ đó sẽ bị đỏ, đôi lúc có rỉ nước hay nước chảy ra từ chỗ đó)
- kèm theo triệu chứng sốt hay ớn lạnh.

Cảm giác của phần dưới của cơ thể thay đổi

Liên lạc bệnh viện nếu quý vị cảm thấy bất cứ sự thay đổi nào ở mông hay chân như:

- yếu đuối
- tê
- cảm giác rần rần.

Các trở ngại thường được phát hiện lúc quý vị còn ở bệnh viện nhưng rất hiếm hoi các triệu chứng có thể xuất hiện cho đến sáu tuần sau.

Số điện thoại liên lạc

Dịch vụ Đau Cấp Tính tại the Women's

Thứ hai đến Thứ sáu 8 giờ sáng – 4 giờ chiều
Điện thoại 8345 2389

Nếu số điện thoại không có người trả lời hãy để lại lời nhắn trong máy nhắn. Nếu cú gọi không được trả lời trong vòng 4 tiếng, vui lòng gọi số điện thoại sau giờ làm việc dưới đây.

Sau Giờ Làm Việc 8345 2000 và yêu cầu được nói chuyện với Bác sĩ chuyên về Gây Tê.