



# Bol u dojkama

Upute ženama koje su bile kod liječnika zbog bolova koje osjećaju u dojkama

the women's  
the royal women's hospital  
victoria australia

Bol u dojkama je vrlo česta pojava. Bol u dojkama se javlja kod većine žena u nekoj fazi života.

Jačina boli, kao i to gdje i kako se osjeća ta bol, različita je kod svake žene. Ta bol može biti oštra, probadajuća, tupa, pulsirajuća ili stalna. Može se osjećati u cijeloj ili u dijelu dojke, u jednoj ili u obje dojke. Bol se može osjećati i ispod pazuha.

Kod većine žena je ta bol jedva uočljiva. Kod drugih, bol je toliko jaka da utječe na njihov svakodnevni život. To stanje obično vremenom prestane.

Medicinski naziv za bol u dojkama je mastalgija.

Bol u dojkama može imati razne uzroke.

## Bolne dojke zbog jačeg lučenja hormona

(često poznato pod imenom predmenstrualna osjetljivost u dojkama)

Žene koje imaju menstruaciju ili uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju (Hormone Replacement Therapy) (HRT) često imaju osjetljive dojke. To se dogodi kada tkivo u dojkama reagira na hormone.

Bol u dojkama izazvana hormonima najčešće nastaje zbog povećanja razine estrogena pred menstruaciju. Estrogen izaziva bujanje mlijecnih kanala i žljezda, što zaustavlja odvodnju tekućina. Mnogim ženama su dojke osjetljive na dodir ili bolne pred menstruaciju, a ponekad i tijekom cijele menstruacije.

Neke žene imaju uvijek bolne dojke u nekim drugim fazama menstrualnog ciklusa.

Hormoni koji dovode do bolnih dojki mogu također izazivati nabreknutost ili kvrgavost u dojkama. Oni mogu utjecati i na veličinu, oblik i osjetljivost cisti i fibroadenoma.

Bol u dojkama zbog jačeg lučenja hormona obično prestane kada žena izgubi menstruaciju, iako se može nastaviti ako je na HRT terapiji.

Hormonski uzrokovana bol u dojkama je normalna i obično nije jaka. Bol koja potraje duže od tjedan dana u vrijeme menstruacije, ili bol koja ženi ne dopušta obavljati svakodnevne aktivnosti, smatra se nenormalnom.

## Drugi razlozi koji dovode do bolnih dojki

Drugi česti uzroci bolova koji se osjećaju u jednoj ili u obje dojke su:

- nošenje grudnjaka koji ne naliježe kako treba ili ne drži pravilno dojke
- napetost
- konzumiranje većih količina kofeina (na primjer u kavi, čaju, nalicima tipa coca-cole, čokoladi i nalicima za energiju kao što je Guarana)
- debljanje (može dovesti do toga da dojke postanu teže)
- ozljeda dojke (to podrazumijeva i ozljak nakon operacije)
- uzimanje određenih vrsta lijekova, osobito kontraceptivnih pilula ili lijekova za smanjenje kolesterola
- ciste ili fibroadenomi u dojkama
- fizička aktivnost koja opterećuje prsni koš, ramena ili prsne mišiće (kao što je dizanje teških stvari)
- bolesti koje pogadaju prsni koš, rebra ili mišiće koji se nalaze ispod dojki

## Bolne dojke i rak

Mnogim ženama je najveći problem da je bol u dojkama znak raka.

Bol u dojkama često nema nikakve veze s rakom.

Liječnik vam nije našao nikakav znak raka u dojkama.

## Dijagnosticiranje boli u dojkama

Da bi otkrio uzrok boli u dojkama, liječnik će uzeti u obzir:

- postoji li ikakav očigledni uzrok koji izaziva bolove (kao što je ožiljak ili ozljeda)
- kad su ti bolovi počeli
- gdje, kada i kakve osjećate bolove
- rezultate fizičkog pregleda i ultrazvuka, mamografije ili drugih pretraga koje je bilo potrebno izvršiti
- imate li još uvijek menstruacije ili uzimate li HRT

Ponekad će, uz sve ove informacije, biti nemoguće utvrditi što je uzrok tim bolovima. To ne znači da bol ne postoji.

## Ponašanje kada je u pitanju bol u dojkama

Ljudi čine razne stvari kada imaju bolove. Ovdje vam navedimo neke savjete koji vam mogu pomoći ako imate bolove ili osjetljivost u dojkama. Većina od njih nije znanstveno dokazana, no nekim ženama pomažu.

**Savjeti za pomoć ako osjećate bolove u dojkama.** Može biti potrebno nekoliko tjedana dok se pokažu rezultati:

- Nošenje grudnjaka koji dobro naliježe i daje dobru potporu
- Smanjenje kafeina (kava, čaj, kola, čokolada i napici koji podižu energiju)
- Uzimanje ulja 'Evening Primrose Oil' (ali ne ako imate epilepsiju)

Ove informacije su namijenje ženama koje su bile na pregledu kod specijaliste za dojku i kojima je dijagnosticirana benigna (nekancerogena) promjena.  
Ove informacije ne mogu biti zamjena za stručne savjete liječnika.

**DISCLAIMER** The Royal Women's Hospital does not accept any liability to any person for the information or advice (or use of such information or advice) which is provided in this fact sheet or incorporated into it by reference. We provide this information on the understanding that all persons accessing it take responsibility for assessing its relevance and accuracy. Women are encouraged to discuss their health needs with a health practitioner. If you have concerns about your health, you should seek advice from your health care provider or if you require urgent care you should go to the nearest hospital Emergency Department. © The Royal Women's Hospital, November 2003. Reviewed December 2018

## osjećanja

Bol u dojkama je za mnoge žene uznenimajuća.

Ta bol može izazvati razna osjećanja i brigu. Strah od raka je razumljiv. Pretrage su također često uznenimirujuće i neprijatne.

U većini slučajeva se žene smire kada saznaju da je bol u dojkama česta pojava koja nije ni štetna ni opasna. Žene, međutim, ponekad osjećaju napetost i nervozu. Razumljivo je zašto se javlja taj osjećaj, osobito ako liječnici ne mogu naći uzork boli u dojakma ili ne mogu predložiti ništa što bi moglo pomoći. Ponekad žene i dalje ostanu u strahu da se radi o raku.

Bol u dojkama kod nekih žena utječe na to kako se osjećaju, na njihovu seksualnost, na odnos s partnerom ili na rad. Teško je živjeti s bilo kakvim bolovima. Živjeti s bolnim dojkama može biti posebno teško jer ljudi često nisu spremni razgovarati o dojkama.

Ako se bol u dojkama loše odražava na vas ili ako ste i dalje zabrinuti, možda će vam pomoći da o svom strahu popričate s nekim od obitelji ili prijatelja tko će vam pružiti potporu.

Možete dobiti obavijesti i savjete od svog liječnika opće prakse ili od medicinske sestre za ženske bolesti u mjesnom društvenom zdravstvenom centru. Možete porazgovarati sa specijalistom ili medicinskom sestrom za njegu dojki ako mislite da bi vam to pomoglo da se smirite.

Možda vam može pomoći i razgovor sa savjetnikom.