

## गर्भनरोधक गोली

यदि आप यौन-क्रिया कर रही हैं और आप गर्भवती नहीं होना चाहती हैं, तो आपको गर्भनरोधक का उपयोग करने की आवश्यकता है। गर्भनरोधक को जन्म-नियंत्रण या परिवार नियोजन भी कहा जाता है।

हर महीने आपके अण्डाशय अंडा रलीज करते हैं। जब कोई पुरुष वीर्यस्रखलन करता है, तो उसके वीर्य में लाखों शुक्राणु होते हैं। गर्भधारण लिए इनमें से केवल एक ही शुक्राणु को आपके एक अंडे से नषिचन करना आवश्यक होता है। आपके यौन-क्रिया करते समय गर्भनरोधक के उपयोग से आपके गर्भवती होने का खतरा कम हो जाता है।

### गर्भनरोधक गोलीयाँ क्या होती हैं?

गर्भनरोधक गोलीयाँ में ऐसे हॉर्मोन होते हैं जो नमिनलखिति के माध्यम से गर्भधारण रोकने में मदद करते हैं:

- » आपके अंडाशय से अंडों के स्रावति होने को रोककर
- » आपके पेडू (गर्भाशय के द्वार) में श्लेषमा को गाढा बनाकर, जो शुक्राणु को आपके गर्भाशय में प्रवेश करना और अंडे को नषिचति करना कठनि बना देता है।

गर्भनरोधक गोली का प्रत्येक दनि सेवन कयिा जाना चाहएि। हर रोज़ एक ही समय पर गोली का सेवन करना सबसे बढ्यिा रहता है।

गर्भनरोधक गोली का प्रत्येक दनि सेवन कयिा जाना चाहएि।

- » संयुक्त मौखकि गर्भनरोधक गोली (COC), जसिमें दो हॉर्मोन होते हैं। पैकों में सक्रयि और नषिक्रयि (चीनी की) गोलीयाँ, दोनों होती हैं।
- » केवल-प्रोजेस्टोजन गोली (मनि पलि या POP)। पैकों में केवल सक्रयि गोलीयाँ ही होती हैं।

### संयुक्त मौखकि गर्भनरोधक गोली (COC)

यदि आप COC ले रही हैं, तो नमिनलखिति बातें याद रखें:

- » हरेक दनि एक ही समय पर प्रत्येक गोली लें, या इस समय के जतिना नकिट संभव हो, उस समय।
- » यदि आप अपने मासकि-धर्म वाले दनि सहति इसके पांचवें दनि तक एक्टवि गोलीयाँ का सेवन करना जारी रखती हैं तो आपको तुरंत ही गर्भावस्था से सुरक्षा मलिति है।
- » यदि आप अपने मासकि-चक्र में कसिी भी अन्य दनि पर गोली लेना शुरू करती हैं, तो आप गर्भधारण से तब तक संरक्षति नहीं होंगी जब तक आपने अपने पहले पैकेट से सात सक्रयि गोलीयाँ न ले ली हों।

यदि आप गोली का सेवन करना भूल जाती हैं, तो आपको क्या करना चाहएि?

यदि गोली का सेवन करने में 24 घंटे तक की देरी हुई हो:

- » तो जसि गोली का सेवन करने में देरी हुई हो जतिनी जल्दी आपको याद आए उसका सेवन करें। कभी-कभी इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप एक ही दनि दो गोलीयाँ का सेवन करती हैं

- » आपको चति करने की ज़रूरत नहीं है, आप गर्भनरोधक से सुरक्षति है

यदि गोली का सेवन करने में 24 घंटे से अधिक की देरी हुई हो:

- » तो जसि गोली का सेवन करना रह गया हो जतिनी जल्दी आपको याद आए उसका सेवन करें। कभी-कभी इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप एक ही दनि दो गोलीयाँ का सेवन करती हैं

- » अगली गोली का सेवन सामान्य समय पर करें।

- » गोली का सेवन सामान्य तरीके के अनुसार करना जारी रखें परन्तु

अगले सात दनिों के लिए अन्य प्रकार के गर्भनरोधक (जैसे कि कंडोम) का प्रयोग करें।

- » सुनश्चिति करें कि आप केवल अगले सात दनिों के लिए ही एक्टवि (सक्रयि) गोली का प्रयोग करती हैं।
- » यदि आप सात दनिों की अवधिपूरी होने से पहले असक्रयि (शूगर) गोलीयाँ तक पहुँच जाती हैं, तो इनका सेवन न करें और सीधे अगली सक्रयि गोलीयाँ का प्रयोग करें। यदि आपको पक्का पता नहीं है कि कौन सी गोली सक्रयि है और कौन सी असक्रयि, तो अपने अपने डॉक्टर या स्थानीय फॉर्मासिस्ट से पूछें।
- » यदि आपने अपनी पछिली असक्रयि (शूगर) गोली के बाद सात सक्रयि गोलीयाँ से कम का सेवन कयिा है तो हो सकता है कि आपको आपातकालीन गर्भनरोधक की ज़रूरत हो। अपने स्थानीय फॉर्मासिस्ट से जांच करें

### COC कतिना प्रभावी होता है?

जब COC को हरेक दनि एक ही समय में लयिा जाता है, तो इसका उपयोग करने वाली 100 में से एक से भी कम महिला गर्भवती होगी। यदि आप गोली को अनयिमति रूप से लेती हैं, या आपको गंभीर दस्त और उल्टी होती है, या अगर आप कोई अन्य दवाई ले रही हैं जो इस गोली के अवशोषण को प्रभावति करे, तो आपके गर्भवती होने की संभावना और अधिक हो जाती है।

यदि आपको इसे लेने में 24 घंटे से अधिक की देरी हो, तो आप गर्भवती हो सकती हैं।

### COC लेने के फायदे क्या हैं?

- » कम रक्तस्राव के साथ एक नयिमित मासकि-चक्र।
- » मुँहास में अक्सर सुधार होता है।
- » मासकि-चक्र में मामूली या बलिकुल भी दर्द या बेचैनी नहीं होती है।

### COC लेने के नुकसान क्या हैं?

- » सँवेदनशील स्तन, मतिली (बीमार महसूस करना) और अपने मासकि-चक्र के बीच में रक्तस्राव होना, मुख्य रूप से गोली लेने के पहले कुछ महीनों में।
- » कुछ महिलाओं में गोली की वजह से वजन में वृद्धि, मनोदशा में बदलाव या कामेच्छा (यौन-क्रिया में अभरुचि) में कमी हो सकती है।
- » दुर्लभ स्वास्थय समस्याएँ।
- » COC यौन संचारति संक्रमणों (STI) से आपका संरक्षण नहीं करेगी।

### स्वास्थय के लिए क्या खतरे हैं?

गोली से गंभीर स्वास्थय समस्याएँ होना दुर्लभ होता है। धूम्रपान से हानिकारक प्रभावों का खतरा बढ जाता है। गोली नमिन रोगों से ग्रस्त महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है:

- » माइग्रेन के कुछ प्रकार
- » रक्त के थक्के बनने का इतहास
- » यकृत की समस्याएँ
- » योनिसि असामान्य रक्तस्राव।

## केवल-प्रोजेस्टोजन गोली (POP)

यदि आप POP ले रही हैं, तो नमिनलखिति याद रखें:

- » आपको इसे प्रत्येक दिन बिना अन्तराल के लेना चाहिए (तब भी जब आप अपने मासिक-चक्र से गुजर रही हों) और इसे प्रत्येक दिन एक ही समय पर लेना चाहिए। POP पैक में कोई नपिक्रयि (चीनी की) गोलियाँ नहीं होती हैं।
- » यदि आप अपने मासिक-चक्र के पहले पांच दिनों में इसे लेना शुरू करती हैं, तो यह तुरंत काम करना शुरू कर देगी। यदि आप किसी दूसरे समय में इसे शुरू करती हैं, तो आपको तबतक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जबतक आपने इसे लगातार तीन दिनों तक न ले लिया हो।
- » यदि आपको POP लेने में तीन घंटे से अधिक की देरी हो जाती है, तो आपको तब तक किसी अन्य गर्भनरोधक का उपयोग करना चाहिए (जैसे कंडोम) जब तक आपने इसे तीन लगातार दिनों तक न ले लिया हो। यदि आप एक बार गोली न लेने के बाद असुरक्षित यौन-क्रिया करती हैं और आप गर्भवती नहीं होना चाहती हैं, तो आपको जतिनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपातकालीन गर्भनरोधक लेना चाहिए।

### POP लेने के क्या फायदे हैं?

- » इसका प्रयोग उन महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन नहीं ले सकती हैं।
- » जब आप स्तनपान करा रही हों, तो इसका उपयोग करना सुरक्षित होता है।
- » यह मासिक-चक्र में दर्द और बेचैनी को कम कर सकती है।

### POP लेने के नुकसान क्या हैं?

- » आपको प्रत्येक दिन एक ही समय पर इसे लेना याद रखना होता है।
- » इससे कुछ पक्ष-प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें अनयिमति रक्तस्राव, मनोदशा में बदलाव, सरिदर्द और मुँहासे होना शामिल है।

### POP कतिनी प्रभावी होती है?

यदि POP का सेवन हर रोज़ एक ही समय पर किया जाता है, तो 100 उपभोक्ताओं में से एक से कम उपभोक्ता गर्भवती होगी। यदि आप अपने मासिक-धर्म के पहले पांच दिनों में इसका सेवन करना शुरू करती हैं तो यह तुरंत ही असर करना शुरू कर देती है। यदि आप किसी अन्य समय में इसका सेवन करना शुरू करती हैं तो आपको इससे तब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी जब तक कि आप लगातार तीन दिनों के लिए इसका सेवन नहीं कर लेती हैं।

यदि आप अपनी गोली का सेवन करना देरी से शुरू करती हैं, या इसका सेवन करने के दो घंटों में आपको गंभीर दस्त या उल्टी होती है, या यदि आप कोई नश्विचि दवाईयों का सेवन कर रही हैं, तो आपके गर्भवती होनी की और अधिक संभावना होती है। यदि आप चिंति हैं तो डॉक्टरी सलाह लें।

### क्या आपको पता है?

- » आपके पास गर्भनरोधक का उपयोग करने और अपने प्रजनन को नियंत्रित करने का अधिकार है।
- » आप अस्थायी और परविरती गर्भनरोधक का उपयोग करने का चयन कर सकती हैं।
- » गर्भनरोधक के ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जसिमें आपको अपने साथी को शामिल करने की जरूरत नहीं होती है।
- » कुछ प्रदाता के पास कुछ गर्भनरोधक अपेक्षाकृत सस्ती कीमत पर उपलब्ध होते हैं।
- » गर्भनरोधकों का उपयोग करने वाली ज्यादातर महिलाओं को पक्ष-प्रभाव के साथ थोड़ी सी परेशानी होती है।

असुवीकरण रॉयल वमिन हॉस्पिटल और फैमिली प्लानिंग वकिटोरिया ऐसी सूचना या सलाह (या ऐसी जानकारी या सलाह के उपयोग) के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से उत्तरदायी नहीं मानते हैं, जो इस तथ्य पत्र में प्रदान की गई है या जसि संदर्भ द्वारा इसमें शामिल किया गया है। हम इस जानकारी को इसका उपयोग करने वाले सभी लोगों द्वारा यह समझने पर देते हैं कि वे इसकी प्रसंगिकता और सटीकता का आकलन करने के लिए जसिमिदारी लेते हैं। महिलाओं को अपनी स्वास्थ्य ज़रूरतों के बारे में स्वास्थ्य चिकित्सक के साथ चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंति हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य देखभाल पदार्ता से सलाह लेनी चाहिए, या यदि आपको तत्काल देखभाल की आवश्यकता है, तो आपको निकटतम अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जाना चाहिए। © The Royal Women's Hospital and Family Planning Victoria, 2015-2018.

## कंडोम का प्रयोग करना हमेशा एक अच्छा वचिर होता है

चाहे आप किसी भी गर्भनरोधक का चयन करें, कंडोम का उपयोग करना यौन संचारति संक्रमणों (STI) से अपने आप को बचाने का एकमात्र मार्ग होता है।

ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम STI chlamydia है। अगर chlamydia का उपचार न किया जाए, तो इससे बांझपन हो सकता है। प्रत्येक बार यौन-क्रिया करते समय कंडोम का उपयोग करना HIV/AIDS और अन्य यौन रोगों के वरिद्ध आपके लिए सबसे अच्छा संरक्षण होता है। अन्य गर्भनरोधक आपको यौन संचारति संक्रमण के वरिद्ध संरक्षण उपलब्ध नहीं कराएंगे।

### पुरुष का कंडोम

पुरुष का कंडोम एक महीन रबर की या सथितिकि परत होती है जसि खड़े (कड़े) लगी पर पहना जाता है।

यह शुक्राणु को एकत्र करता है और उन्हें योन और गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है (जहाँ बच्चे का विकास होता है)।

आपको प्रत्येक बार यौन-क्रिया करते समय एक नए कंडोम का उपयोग करना चाहिए और इसे सही ढंग से पहनने और उतारने के लिए ध्यान रखना चाहिए। कंडोम केवल एकल उपयोग के लिए होते हैं और इन्हें फार्मेसियों (केमसिटों) से खरीदा जा सकता है।

## और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है

- » अपने स्थानीय चिकित्सक (जीपी) से
- » अपने स्थानीय फार्मासिट से
- » Nurse on Call – 1300 60 60 24
- » Family Planning Victoria  
टेली: 03 9257 0100 या 1800 013 952 ((न:शुल्क कॉल))  
वेब: www.fpv.org.au
- » Women's Welcome Centre (केवल वकिटोरिया में)  
Royal Women's Hospital  
टेलीफोन: (03) 8345 3037 या 1800 442 007 (ग्रामीण क्षेत्रों से फोन करने वालों के लिए)  
ई-मेल: wwcadmin@thewomens.org.au
- » Women's दवाएँ सूचना सेवा  
टेली: (03) 8345 3190  
ईमेल: drug.information@thewomens.org.au

### संबंधित तथ्य पत्रक

- » गर्भनरोधक - आपके पास उपलब्ध विकल्प
- » लंबे समय तक कायररत परविरती गर्भनरोधक (LARC)
- » आपातकालीन गर्भनरोधक