



U tuyến xơ

Thông tin dành cho phụ nữ đã được chẩn đoán là có u tuyến xơ

Bác sĩ chuyên khoa thấy vú của quý vị có u tuyến xơ (fibroadenoma). U tuyến xơ không phải là ung thư.

U tuyến xơ lớn nhỏ nhiều cỡ khác nhau. Có thể là nhỏ hơn viên bi hay lớn hơn trái banh gân. Hầu hết các u tuyến xơ đều xuất hiện một cách đột ngột và sau đó sẽ giữ nguyên kích thước. Một số khác teo đi hay tiếp tục lớn. U tuyến xơ chịu ảnh hưởng của nội tiết tố như là bất kỳ cơ vú nào khác. U tuyến xơ thường thay đổi kích thước trong chu kỳ kinh nguyệt hay trong lúc thai nghén.

U tuyến xơ thường giống như là cao su và rắn chắn, nhưng có thể khó mà sờ được rõ ràng. Nếu ấn vào cục u này, quý vị sẽ thấy là nó sẽ di chuyển đi nơi khác dưới ngón tay của quý vị. Chính vì vậy mà một số người gọi u tuyến xơ là 'chuột vú'. U tuyến xơ không di chuyển xa trong phạm vi của vú.

Thông thường, u tuyến xơ không gây ra đau đớn. Tuy nhiên, nó có thể làm cho quý vị cảm thấy khó chịu hay nhạy cảm. Phụ nữ thường cảm thấy u tuyến xơ của mình dễ bị căng hơn trong những ngày sắp có kinh. Ấn hay thọc vào cục u sẽ làm cho nó càng dễ bị đau hơn.

Các nghiên cứu gia không biết nguyên nhân gây ra u tuyến xơ nhưng chúng ta biết rằng đây là một tình trạng khá phổ

thông, nhất là với phụ nữ trong khoảng tuổi từ 15 đến 25. Cứ trong sáu phụ nữ thì có một người (15%) có u tuyến xơ vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

U tuyến xơ và ung thư

Đối với nhiều phụ nữ, nỗi lo lắng lớn nhất của họ về u tuyến xơ là sợ u tuyến xơ là, hay sẽ trở thành ung thư.

U tuyến xơ không phải là ung thư.

Nguy cơ u tuyến xơ trở thành ung thư cũng giống như những phần khác của vú.

Bác sĩ chuyên khoa cũng có thể lấy một số tế bào từ cục u để thử nghiệm. Phẫu thuật này được gọi là sinh thiết.

Quyết định phải làm gì với u tuyến xơ này

Hầu hết các u tuyến xơ được để nguyên và không cần phải chữa trị gì cả. Nhiều phụ nữ và bác sĩ chuyên khoa của họ quyết định là không cần thiết để lấy u tuyến xơ ra. Để nguyên u tuyến xơ cũng an toàn.

Mặc dù u tuyến xơ không phải là ung thư, một số phụ nữ cảm thấy khó mà tin chắc được điều này. Một số phụ nữ yêu cầu giải phẫu cắt bỏ u tuyến xơ để không còn lo lắng nữa.

Thỉnh thoảng, phụ nữ yêu cầu cắt bỏ u tuyến xơ vì nó làm cho họ bị khó chịu hay đau đớn. Tuy nhiên, theo của phẫu thuật cũng có thể làm cho quý vị cảm thấy khó chịu hay đau đớn, nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định cắt bỏ.

Nếu u tuyến xơ tiếp tục phát triển, đôi khi bác sĩ chuyên khoa cũng đề nghị là nên cắt bỏ đi trước khi u tuyến xơ lớn hơn, để giảm bớt vết theo.

Chẩn đoán u tuyến xơ

Để chẩn đoán cục u trong vú của quý vị có phải là u tuyến xơ hay không, bác sĩ chuyên khoa phải xem xét những điều sau đây:

- Kết quả khám trực tiếp và siêu âm hay chụp hình
- Tiểu sử, hình dạng và kích thước của cục u
- Gia đình của quý vị có tiểu sử bị ung thư vú hay tử cung không

Giải phẫu cắt bỏ u tuyến xơ

Mức độ giải phẫu tùy thuộc vào
tầm cỡ của u tuyến xơ. Hầu
hết các cuộc giải phẫu được
thực hiện khi bệnh nhân được
gây mê. Thông thường quý vị
có thể về nhà trong cùng một
ngày.

Sẽ có theo ở chỗ cắt bỏ u
tuyến xơ.

Sắp tới phải làm gì ?

U tuyến xơ không làm cho có
nguy cơ bị ung thư vú gia tăng.

Quý vị nên chụp hình vú để
truy tìm ung thư theo đề nghị
dành cho phụ nữ cùng lứa tuổi
và có tiểu sử gia đình giống
như quý vị.

Tất cả các phụ nữ đều phải để
ý tới những thay đổi không
bình thường của vú. Nếu vú
của quý vị có những thay đổi
khác với thay đổi bình thường
vì nội tiết tố, quý vị nên nhờ
bác sĩ gia đình (GP) kiểm tra.

*Tờ thông tin này dành cho phụ nữ đã được bác sĩ chuyên khoa về vú khám và không có ý định
thay thế cho sự cố vấn của bác sĩ chuyên khoa.*

Cảm xúc

Đối với nhiều phụ nữ, vú thay đổi
khác hơn bình thường khiến cho
họ rất buồn phiền. Điều này có
thể gợi lên nhiều cảm xúc và lo
lắng. Sự bị ung thư cũng là một
điều dễ hiểu. Ngoài ra, các thử
nghiệm cũng thường làm cho
phụ nữ cảm thấy khó chịu về
tinh thần lẫn thể xác.

Hầu hết lúc nào, phụ nữ cũng
cảm thấy nhẹ nhõm khi biết vú
thay đổi là một tình trạng phổ
thông không có hại hay nguy
hiểm gì cả. Tuy nhiên, thỉnh
thoảng, họ vẫn tiếp tục lo sợ bị
ung thư. Một số phụ nữ còn cảm
thấy sự thay đổi của vú làm ảnh
hưởng tới cảm xúc của họ về
bản thân, tình dục hay quan hệ.

Nếu u tuyến xơ gây ra những
ảnh hưởng tiêu cực cho cuộc
sống của quý vị, chia sẻ cảm
xúc của mình với một thành viên
trong gia đình hay bạn bè nào
thông cảm với mình có thể là
một điều hữu ích.

Quý vị cũng có thể xin bác sĩ gia
đình hay Y Tá Chuyên về Y Tế
Phụ Nữ tại trung tâm y tế cộng
đồng địa phương cung cấp
thông tin hay cho ý kiến. Quý vị
cũng có thể nói chuyện với bác
sĩ chuyên khoa hay Y Tá Chăm
Sóc Ngực tại Phòng Khám Vú
nếu điều này làm quý vị yên
tâm.

Nói chuyện với nhân viên cố vấn
cũng có thể giúp quý vị.

Nếu u tuyến xơ của quý vị làm
cho quý vị bị đau đớn, hãy xin
bác sĩ chuyên khoa hay bác sĩ
gia đình tờ thông tin về Đau Vú.

QUÝ VỊ VÀ BÁC SĨ GIA ĐÌNH (GP)

**Nếu quý vị đã gặp
bác sĩ chuyên khoa
tại Phòng Khám Vú,
tiếp theo quý vị nên
đi bác sĩ gia đình.
Làm như vậy quý vị
có thể bảo đảm là
mình hiểu rõ các
thông tin, thử nghiệm
hay chẩn đoán của
bác sĩ chuyên khoa.**

**Đây cũng là một cơ
 hội tốt để nói về suy
 nghĩ và cảm giác về
 sự thay đổi của vú
 hay chẩn đoán.**

**Bác sĩ gia đình có thể
giúp quý vị nếu quý
vị tham khảo ý kiến
thứ hai về sự thay đổi
này.**

**Nếu quý vị không có
bác sĩ gia đình mà
quý vị đi thường
xuyên, hãy hỏi bạn
bè, gia đình hay
trung tâm y tế cộng
đồng địa phương xem
họ có đề nghị gì
không.**

**Có một bác sĩ gia
đình - người mà quý
vị tới khám thường
xuyên và tin tưởng là
một điều hay.**

DISCLAIMER The Royal Women's Hospital does not accept any liability to any person for the information or advice (or use of such information or advice) which is provided in this fact sheet or incorporated into it by reference. We provide this information on the understanding that all persons accessing it take responsibility for assessing its relevance and accuracy. Women are encouraged to discuss their health needs with a health practitioner. If you have concerns about your health, you should seek advice from your health care provider or if you require urgent care you should go to the nearest hospital Emergency Department. © The Royal Women's Hospital, November 2003. Reviewed December 2018